

登園届 (保護者記入)

龍翔寺こども園 園長 殿

平成
令和

年 月 日生

園児名

【 診断名 】

令和 年 月 日より 医療機関名「 」に
 において治療を開始。病状が回復し、集団生活に支障はない状態と判断されましたの
 で令和 年 月 日より登園いたします。

令和 年 月 日

保護者名

印

【保護者様】

乳幼児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願い致します。なお、園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮お願い致します。

医師の診断を受け、保護者が記入する登園届を求める感染症

病 名	感染しやすい期間	登園の目安
新型コロナウイルス	発症前 2 日から発症後 3 日間は非常に強い感染力でピークを迎える	発症後 5 日を経過し、かつ症状軽快した後 1 日を経過してから
インフルエンザ	症状がある期間(発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 3 日を経過してから
流行性嘔吐下痢症 (ロタウイルス・ノロウイルス等)	症状がある間と、症状消失後 1 週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)	症状が消失してから 1 ～ 2 日経過後(普段の食事が摂れること)
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日間	抗菌薬治療開始後 24 時間～48 時間経過後、全身状況良好で可
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるなど、全身状態良好で可
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に 1 ヶ月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるなど、全身状態良好で可
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まり、医師が症状改善と判断してから
伝染性紅斑 (りんご病)	発疹出現前の 1 週間	全身状態良好で可
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良い事
帯状疱疹	水疱を形成している間	解熱し、すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく、全身状態が良い事

登園届 (保護者記入)

龍翔寺こども園 園長 殿

平成
令和

年 月 日生

園児名

【 診断名 】

令和 年 月 日より 医療機関名「 」に
 において治療を開始。病状が回復し、集団生活に支障はない状態と判断されましたので令和 年 月 日より登園いたします。

令和 年 月 日

保護者名

印

【保護者様】

乳幼児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願い致します。なお、園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮お願い致します。

医師の診断を受け、保護者が記入する登園届を求める感染症

病 名	感染しやすい期間	登園の目安
新型コロナウイルス	発症前 2 日から発症後 3 日間は非常に強い感染力でピークを迎える	発症後 10 日を経過し、かつ症状軽快した後 1 日を経過してから (8 日日以降は病後児利用可)
インフルエンザ	症状がある期間 (発症前 24 時間から発病後 3 日程度までが最も感染力が強い)	発症後 5 日を経過し、かつ解熱後 3 日を経過してから
流行性嘔吐下痢症 (ロタウイルス・ノロウイルス等)	症状がある間と、症状消失後 1 週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)	症状が消失してから 1 ～ 2 日経過後 (普段の食事が摂れること)
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後 1 日間	抗菌薬治療開始後 24 時間～48 時間経過後、全身状況良好で可
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるなど、全身状態良好で可
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 (便の中に 1 ヶ月程度ウイルスを排出しているので注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれるなど、全身状態良好で可
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まり、医師が症状改善と判断してから
伝染性紅斑 (りんご病)	発疹出現前の 1 週間	全身状態良好で可
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良い事
帯状疱疹	水疱を形成している間	解熱し、すべての発疹が痂皮化してから
突発性発疹		解熱し機嫌がよく、全身状態が良い事